

たかもりメテックだより

HIVとは？

HIVとは、ヒト免疫不全ウイルス（**Human Immunodeficiency Virus**）のことです。HIVは菌やウイルスから体を守る免疫の中心であるTリンパ球（CD4細胞）などに感染し、**免疫力を低下させます。**

HIVに感染するとどうなる？

HIVに感染すると、通常6～8週間後に、血液中にHIV抗体が検出されます。また、感染から2～4週間以内にインフルエンザに似た症状が出る場合があります。

その後、**自覚症状のない時期（無症候期）**が数年～10年続きます。さらに進行すると、**免疫力が低下し、本来なら自分の力で抑えることのできる病原体にも感染しやすくなってしまいます。**

このようにして、抵抗力が落ちることで発症する疾患のうち、カンジダ症（食道、気管、気管支、肺）やニューモシスティス肺炎など代表的な23の疾患が指標になっており、これらを発症した時点でエイズと診断されます。

HIVの感染経路

HIVの感染力は弱く、唾液、涙、尿などの体液には他人に感染させるだけのウイルスは含まれていません。そのため、**性行為以外の社会生活の中でうつることはありません。**HIVは血液、精液、膣分泌液、母乳などに多くに分泌され、**以下の三つの経路で感染します。**

1. 性的感染

最も多い感染経路が、性行為による感染です。

膣や口腔の粘膜は重層ですが、腸管粘膜は単層であることから傷つきやすいため、HIVが侵入しやすく、感染リスクが高くなります。

2. 血液感染

HIVが含まれる血液の輸血や、麻薬の回し打ちなどの注射器具の共用によって感染します。

3. 母子感染

母親がHIVに感染している場合、胎内感染、産道感染、母乳による感染の可能性があります。

母親が治療薬を飲むことや、母乳を与えないこと等の予防によって赤ちゃんへの感染を0.5%未満に抑えることができます。

HIVの検査ができる場所

全国の保健所で無料・匿名で検査が受けられます。

有料ですが、泌尿器科、産婦人科などの医療機関でもHIV検査は受けられます。



HIVの治療法

現在、HIVを体内から完全に取り除く治療法はありませんが、HIVの治療法・治療薬は日々進歩しており、抗HIV薬を適切に服薬してエイズの発症を防ぐことで**感染前と変わらない日常生活を送ることができる**ようになっていきます。ただし、薬をきちんと飲み続けないと、薬剤耐性のあるウイルスが出現し、薬が効かなくなってしまいますので、治療は必ず継続しなければいけません。

早期発見が最も重要

エイズを発症して未治療の場合、余命は2～3年とされています。自覚症状がないうちにHIV感染を知ることができれば、エイズの発症を抑える適切な治療が受けられます。HIVを**早期に発見し、治療を始めることが最も重要**です。思い当たることがあれば、必ず**検査を受けましょう。**



岩本医院

☎(0827)84-0011

	8:30 ~ 12:00	14:00 ~ 17:00
月	●	●
火	●	●
水	●	●
木	●	×
金	●	●
土	●	×

受付時間 (8:30~11:30 14:00~17:00)

木曜日・土曜日は午後休診

日曜日は終日休診とさせていただきます。

小児科の午後の診療は16:00~となりますので
ご注意ください。

◆ホームページ◆

<http://www.iwhospital.com/>

QRコードからも
ご覧頂けます →



2019年6月

月	火	水	木	金	土	日
					1 午後休診	2 終日休診
3	4	5	6 午後休診	7	8 午後休診	9 終日休診
10	11	12	13 午後休診	14	15 午後休診	16 終日休診
17	18	19	20 午後休診	21	22 午後休診	23 終日休診
24	25	26	27 午後休診	28	29 午後休診 小児科休診	30 終日休診

2019年7月

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4 午後休診	5	6 午後休診	7 終日休診
8	9	10	11 午後休診	12	13 午後休診	14 終日休診
15 海の日	16	17	18 午後休診	19	20 午後休診	21 終日休診
22	23	24	25 午後休診	26	27 午後休診	28 終日休診
29	30	31				